

## PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

### Conoxia 100 % medisinsk gass, komprimert

oksygen 100 % (O<sub>2</sub>)

#### Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
- Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

#### I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva CONOXIA er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker CONOXIA
3. Hvordan du bruker CONOXIA
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer CONOXIA
6. Ytterligere informasjon

### 1. HVA CONOXIA ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning.

Conoxia inneholder oksygen og brukes til inhalasjon. Den er fargeløs, luktfri og uten smak, og leveres i gassylindere med trykkregulator for å redusere gasstrykket. Gassylinderen inneholder kun rent oksygen.

Conoxia øker oksygenivået i blodet (økt oksygenmetning). Conoxia gjør at det transporteres mer oksygen til vevet i kroppen.

Conoxia brukes:

- til å behandle eller forebygge akutt eller kronisk oksygenmangel
- som en del av gassflow i anestesi, smertelindring og intensivbehandling
- som drivgass ved inhalasjon av andre legemidler (behandling med nebulisator)
- som førstehjelpsbehandling med 100% oksygen ved dykkersyke
- ved behandling av akutte anfall av Hortons hodepine (cluster headache)
- i trykkamre for å redusere risikoen for skade forårsaket av dekompresjonssyke (dykkersyke), gass- eller luftbobler i blodkar og ved behandling av alvorlig karbonmonoksidforgiftning og koldbrann

### 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER CONOXIA

**Hvis du har fått resept på Conoxia, må du informere legen hvis du:**

– lider av kronisk lungesykdom, for eksempel astma eller KOLS.

**Vis forsiktighet ved bruk av Conoxia:**

- Hvis barnet ditt trenger ekstra oksygen og er prematurt. Ikke gi større mengde av Conoxia enn det som er anbefalt av legen.

- Hvis legen din har foreskrevet overtrykksbehandling, bør du være klar over risikoen for å få skade på lungehinnen (såkalt pneumotoraks).

### **Bruk av andre legemidler sammen med Conoxia**

Dersom du tar eller har fått resept på bleomycin (for å behandle kreft), amiodaron (for å behandle hjertesykdom), furadantin eller lignende antibiotika (for å behandle infeksjoner), bør du rådføre deg med lege før du bruker medisinsk oksygen, siden det kan være en mulighet for skader på lungene.

### **Graviditet og amming**

Conoxia kan brukes ved graviditet.

Conoxia kan brukes i ammeperioden.

Hvis du har fått resept på overtrykksbehandling (behandling i kammer), bør du informere legen din hvis du er gravid eller tror du er gravid.

### **Kjøring og bruk av maskiner**

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Du kan kjøre etter å ha brukt Conoxia, forutsatt at legen mener du er skikket og er i stand til det.

## **3. HVORDAN DU BRUKER CONOXIA**

Bruk alltid Conoxia slik legen har fortalt deg. Dosen må bare endres i samråd med legen.

Conoxia brukes til inhalasjon. Normal dose til voksne ved behandling eller forebygging av *akutt oksygenmangel* er 3–4 liter per minutt ved bruk av nesekateter eller 5–15 liter per minutt ved bruk av maske.

Dersom Conoxia skal brukes til andre tilstander, må dette gjøres i samråd med legen.

Conoxia pustes vanligvis inn gjennom et nesekateter eller en maske. Du puster enten selv – du "puster spontant" – eller du får hjelp til å puste ved hjelp av en respirator/ventilator.

*Les bruksanvisningen/pasientinformasjonen for pusteutstyret nøye!*

### **Dersom du tar for mye av Conoxia**

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

I utsatte situasjoner kan for mye Conoxia påvirke pustefunksjonen og i spesielle tilfeller forårsake karbondioksidforgiftning/bevisstløshet.

Langvarig bruk av for mye Conoxia kan føre til smerter, tørrhoste og til og med pustebesvær.

Hvis disse tegnene på overdosering oppstår, må du alltid oppsøke lege, sykehus eller ringe Giftinformasjonen.

### **Sikkerhetsanvisninger**

- Conoxia er kun ment for medisinsk bruk.
- Sylindren skal kun kobles til en tilkobling ment for medisinsk oksygen.
- Oksygen (beholder og sylinder) må kun brukes i rom med god ventilasjon.
- Gassylindrene må ikke utsettes for sterk varme.
- Røyking og åpen flamme er strengt forbudt i rom hvor Conoxia brukes, da dette øker brannfaren.
- Ikke bruk brødrister, hårføner eller lignende elektrisk utstyr mens du er tilkoblet Conoxia.
- Legg aldri oksygenmaske eller nesekateter direkte på tekstiler mens flaskeventilen er åpen . Materialer som er gjennomtrukket av oksygen kan være svært brennbare / fører til økt brannfare. Hvis dette skulle skje, må tekstilene ristes grundig og luftes godt.

- Slå av utstyret når det ikke er i bruk.
- I tilfelle brann – slå av utstyret.
- Gassylindere må fraktes i sikkerhet dersom det oppstår fare for brann.
- Bruk aldri fett, olje eller lignende stoffer til å smøre skruer som setter seg fast, ettersom det kan medføre en fare for selvantenne ved kontakt med Conoxia under *høyt trykk*.
- Trykkregulatoren må åpnes langsomt og forsiktig.
- Må håndteres forsiktig. Påse at gassylindere ikke faller ned / mistes i bakken eller utsettes for støt.
- Hold sylindere ren og tørr.
- Må oppbevares og transporteres med lukkede ventiler, samt med beskyttelseshetten og dekselet på plass dersom dette finnes.

#### 4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Conoxia forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

*Behandling på annet sted enn sykehus:*

Behandling med Conoxia gjennom nesekateter kan forårsake tørre slimhinner i nese og munn fordi gassen er tørr.

Les også avsnittet ”Dersom du tar for mye av Conoxia”.

*Behandling på sykehus:*

Bivirkninger ses vanligvis ved høye konsentrasjoner (over 70 %) og etter langvarig behandling (minst 6–12 timer).

*Vanlige* (flere enn 1 av 100 pasienter)

Ingen

*Mindre vanlige* (færre enn 1 av 100 pasienter)

Åndedrettsrelaterte smerter, tørrhoste og andpustenhet

Overtrykksbehandling

Økt trykk i mellomøret, hull på trommehinnen

*Sjeldne* (færre enn 1 av 1000 pasienter)

Nyfødte utsatt for høye oksygenkonsentrasjoner: Skade på øyet, som kan føre til svekket syn.

*Svært sjeldne* (færre enn 1 av 10 000 pasienter)

Alvorlig pustebesvær (åndenødssyndrom)

Overtrykksbehandling

Angst eller forvirring og epileptiske anfall.

#### 5. HVORDAN DU OPPBEVARER CONOXIA

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Sylindere skal oppbevares i et godt ventilert rom og ikke utsettes for sterk varme.

Hold sylindere ren og tørr.

Påse at gassylindere ikke faller ned / mistes i bakken eller utsettes for støt.

Oppbevares i sikker avstand fra brennbare materialer.

Bruk ikke Conoxia etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.

## 6. YTTERLIGERE INFORMASJON

### Sammensetning av Conoxia

- Virkestoff er 100 % oksygen (kjemisk symbol: O<sub>2</sub>)
- Conoxia inneholder ingen andre komponenter.

### Hvordan Conoxia ser ut og innholdet i pakningen

Skulderen på gassylindere er hvitlakkert (oksygen). Hoveddelen av gassylindere er hvit (medisinsk gass). I Finland kan gassylindere hoveddel også være turkis.

Sylinderstørrelse i liter	1	1,1	1,2	2	2x2	2,5	3	4	4,7	5	6	10	15	20	21,3	50	2x21,3	10 x 50	12 x 50
---------------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	-----	---	---	----	----	----	------	----	--------	---------	---------

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

### Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

AGA AB  
SE-181 81 Lidingö  
Sverige

### Tilvirkere

AGA AS  
Strømsveien 324  
NO-1081 Oslo  
Norge

AGA AS  
Vermlandsgade 55  
DK-2300 København S  
Danmark

Oy AGA AB  
Agantie 2  
FI-11310 Riihimäki  
Finland

ISAGA ehf  
Breidhöfða 11  
ICE-110 Reykjavik  
Island

AGA SIA  
Akemenu iela 66  
LV-5001 Ogre  
Latvia

AGA Gas AB  
Rotevägen 2  
SE-192 78 Sollentuna  
Sverige

Oy AGA Ab  
Kalliotie 2  
FI-04360 Tuusula  
Finland

### Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 03.12.2010

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

AGA AS  
Strømsveien 324  
1081 Oslo  
Tlf: 23 17 72 00